

# 10. L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X-gyakorlat

Tómacs Tibor

Eszterházy Károly Katolikus Egyetem  
Matematikai és Informatikai Intézet

2023. október 31.

## Feladat

Készítsen  $\text{\LaTeX}$ -kódot, melynek ez prezentáció az eredménye!

## Feladat

Készítsen  $\text{\LaTeX}$ -kódot, melynek ez prezentáció az eredménye!

A megoldás letölthető innen:

<https://tibortomacs.github.io/latex-tutorial-hu/latex-gyak10.zip>

# Nagy számok Bernoulli-féle törvénye

# Nagy számok Bernoulli-féle törvénye

Csebisev 1866

# Nagy számok Bernoulli-féle törvénye

Csebisev 1866

Legyen  $G_n$  egy adott  $A$  esemény gyakorisága  $n$  kísérlet után.

# Nagy számok Bernoulli-féle törvénye

## Csebisev 1866

Legyen  $G_n$  egy adott  $A$  esemény gyakorisága  $n$  kísérlet után. Ekkor minden  $\varepsilon > 0$  esetén

$$P\left(\left|\frac{G_n}{n} - P(A)\right| \geq \varepsilon\right) \leq \frac{P(A)P(\bar{A})}{n\varepsilon^2}.$$

# Nagy számok gyenge törvénye



# Nagy számok gyenge törvénye

Legyenek  $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$  olyan valószínűségi változók, melyek

# Nagy számok gyenge törvénye

Legyenek  $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$  olyan valószínűségi változók, melyek

- páronként függetlenek,

# Nagy számok gyenge törvénye

Legyenek  $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$  olyan valószínűségi változók, melyek

- páronként függetlenek,
- azonos eloszlásúak,

# Nagy számok gyenge törvénye

Legyenek  $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$  olyan valószínűségi változók, melyek

- páronként függetlenek,
- azonos eloszlásúak,
- véges szórásúak.

# Nagy számok gyenge törvénye

Legyenek  $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$  olyan valószínűségi változók, melyek

- páronként függetlenek,
- azonos eloszlásúak,
- véges szórásúak.

Ekkor minden  $\varepsilon > 0$  esetén

$$P\left(\left|\frac{X_1 + \dots + X_n}{n} - E(X_1)\right| \geq \varepsilon\right) \leq \frac{D^2(X_1)}{n\varepsilon^2}.$$

# Nagy számok erős törvénye

# Nagy számok erős törvénye

Kolmogorov 1933

# Nagy számok erős törvénye

Kolmogorov 1933

Legyenek  $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$  olyan valószínűségi változók, melyek



# Nagy számok erős törvénye

## Kolmogorov 1933

Legyenek  $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$  olyan valószínűségi változók, melyek

- függetlenek,

# Nagy számok erős törvénye

## Kolmogorov 1933

Legyenek  $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$  olyan valószínűségi változók, melyek

- függetlenek,
- azonos eloszlásúak,

# Nagy számok erős törvénye

## Kolmogorov 1933

Legyenek  $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$  olyan valószínűségi változók, melyek

- függetlenek,
- azonos eloszlásúak,
- véges várható értékűek.

# Nagy számok erős törvénye

## Kolmogorov 1933

Legyenek  $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$  olyan valószínűségi változók, melyek

- függetlenek,
- azonos eloszlásúak,
- véges várható értékűek.

Ekkor

$$P \left( \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{X_1 + \dots + X_n}{n} = E(X_1) \right) = 1.$$

# Nagy számok erős törvénye

## Kolmogorov 1933

Legyenek  $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$  olyan valószínűségi változók, melyek

- függetlenek,
- azonos eloszlásúak,
- véges várható értékűek.

Ekkor

$$P \left( \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{X_1 + \dots + X_n}{n} = E(X_1) \right) = 1.$$

Másképpen fogalmazva, ekkor  $\frac{X_1 + \dots + X_n}{n}$  majdnem biztosan konvergál  $E(X_1)$ -hez.

# Megjegyzések

# Megjegyzések

Ha a nagy számok gyenge törvényében  $X_i$  egy esemény indikátorváltozója, akkor a Bernoulli-féle nagy számok törvényét kapjuk.

# Megjegyzések

Ha a nagy számok gyenge törvényében  $X_i$  egy esemény indikátorváltozója, akkor a Bernoulli-féle nagy számok törvényét kapjuk.

A nagy számok Kolmogorov-féle erős törvényének állítása páronkénti függetlenség esetén is igaz marad.



# Határeloszlási tételek

# Határelloszlási tételek

## Centrális határelloszlási tétel

Legyenek  $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$  független, azonos eloszlású, pozitív szórású valószínűségi változók. Ekkor  $X_1 + \dots + X_n$  standardizáltjának határelloszlása standard normális.

# Határeloszlási tételek

## Centrális határeloszlási tétel

Legyenek  $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$  független, azonos eloszlású, pozitív szórású valószínűségi változók. Ekkor  $X_1 + \dots + X_n$  standardizáltjának határeloszlása standard normális.

## Moivre – Laplace-tétel

Ha az  $X_i$  valószínűségi változók azonos karakterisztikus eloszlásúak, akkor a centrális határeloszlási tételből speciálisan az úgynevezett Moivre – Laplace-tételt kapjuk.

KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!